

**Перечень  
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках  
диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке  
репродуктивного здоровья**

Диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста для оценки репродуктивного здоровья (далее – диспансеризация) проводится в два этапа в целях выявления у женщин и мужчин признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на репродуктивное здоровье, последующее течение беременности, родов и послеродового периода, а также факторов риска их развития.

Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации на первом этапе у женщин:

- прием (осмотр) врачом – акушером-гинекологом;
- пальпация молочных желез;
- осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование;
- микроскопическое исследование влагалищных мазков;
- проведение один раз в три года у женщин в возрасте от 18 до 29 лет жидкостного цитологического исследования микропрепарата шейки матки;
- проведение у женщин в возрасте от 18 до 29 лет лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции;
- проведение один раз в 5 лет у женщин в возрасте от 30 до 49 лет ко-тестирования (жидкостного цитологического исследования микропрепарата шейки матки совместно с проведением определения ДНК вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом полимеразной цепной реакции);

Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации на первом этапе у мужчин, - прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии - врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации на втором этапе у женщин по результатам первого этапа диспансеризации в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и при наличии показаний:

- проведение в возрасте от 30 до 49 лет лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции;
- ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла;
- ультразвуковое исследование молочных желез;

- повторный прием (осмотр) врачом – акушером-гинекологом.

Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации на втором этапе у мужчин по результатам первого этапа диспансеризации в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и при наличии показаний:

- спермограмма;
- микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции;
- ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки;
- повторный прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).